

# POSTINOR<sup>®</sup>

Levonorgestrel 1,5 mg

saiba mais em:

[www.postinor.pt](http://www.postinor.pt)

**Postinor<sup>®</sup>** 1500 microgramas de levonorgestrel, comprimido. Indicado para contraceção de emergência, a utilizar nas 72 horas que se seguem a uma relação sexual não protegida ou em caso de falha de um método contraceutivo. O comprimido deverá ser tomado assim que possível, preferencialmente nas primeiras 12 horas, e não mais tarde que as 72 horas, após a relação sexual não protegida. Contraindicado em caso de hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. A contraceção de emergência é um método ocasional. Em caso algum deve substituir um método contraceutivo regular. A contraceção de emergência não previne uma gravidez em todos os casos. Se houver uma incerteza do momento em que ocorreu a relação sexual não protegida ou se a mulher tiver tido uma relação sexual não protegida há mais de 72 horas no mesmo ciclo menstrual, a conceção poderá ter ocorrido. O metabolismo do levonorgestrel é aumentado pelo uso concomitante de indutores enzimáticos hepáticos. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica. Leia atentamente as informações da rotulagem e o folheto informativo. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o médico ou farmacêutico.



GEDEON RICHTER

A CUIDAR DA SAÚDE  
DA MULHER DESDE 1901

Farmacovigilância: Telf.: (+351) 239 098 368 | [drugsafety.pt@gedeonrichter.eu](mailto:drugsafety.pt@gedeonrichter.eu)  
Pedidos informação médica: Telf.: (+351) 239 098 368 | [medinfo.pt@gedeonrichter.eu](mailto:medinfo.pt@gedeonrichter.eu)

Gedeon Richter Portugal

Edifício Central Office - Av. D. João II, nº 45, Piso 4 C, 1990-084 Lisboa  
Telf.: 210 994 124 - Fax: 210 993 685  
[richterpt@gedeonrichter.eu](mailto:richterpt@gedeonrichter.eu)

[www.gedeonrichter.pt](http://www.gedeonrichter.pt)

**POSTINOR<sup>®</sup>**  
a pílula do "Dia Seguinte"!



GEDEON RICHTER

Since 1901

## Como atua **POSTINOR**®?

Impedindo que os seus ovários liberem um óvulo e prevenindo que o espermatozoide fertilize qualquer óvulo que já possa ter sido libertado.

**Postinor**® consiste na toma de uma única pílula para prevenir uma gravidez não desejada até 72 horas após uma relação sexual não protegida ou se o seu método contraceptivo habitual falhou.

## A contraceção oral de emergência afeta a menstruação?

Normalmente não.

## Quando tomar Postinor?

Quando o preservativo se rompe ou se desloque.

Não se sente segura em relação ao sexo interrompido e/ou método do calendário.

Teve alguma falha relacionada com o seu método contraceptivo habitual (esqueceu-se de tomar uma pílula ou vomitou 2 a 3 horas depois de ter tomado a pílula ou teve alguma diarreia grave).

Tomou concomitantemente outra medicação que poderá reduzir a eficácia da sua pílula e está preocupada com a possibilidade de engravidar.

## Quanto mais cedo melhor, vá a uma farmácia e tome **POSTINOR**® num espaço de tempo até 72 horas.

Quanto mais cedo tomar Postinor®, mais eficaz é a prevenção da gravidez. Algumas mulheres chamam contraceção de emergência, outras pílula do dia seguinte, o que não implica ter de esperar pelo dia seguinte. Poderá tomar Postinor® logo após a relação sexual ou até 72 horas depois do seu método habitual ter falhado ou não ter utilizado qualquer método contraceptivo.

## O que fazer se tiver vômitos depois de tomar **POSTINOR**®?

Se tiver vômitos nas três horas que se seguem à toma do comprimido, deverá tomar outro comprimido imediatamente.

## Estou a amamentar posso tomar **POSTINOR**®?

Pode tomar Postinor® imediatamente após a amamentação e evite amamentar até 8 horas após a toma do comprimido. Poderá recolher o leite com uma bomba mamária para administração futura.

**APENAS 1 POSTINOR**®

PÍLULA PARA EVITAR UMA  
GRAVIDEZ INDESEJADA

**Disponível em todas as farmácias  
sem prescrição médica**



# **POSTINOR**®

## a pílula do "Dia Seguinte"!

